


Abordaje en Atención Primaria: paciente con COVID-19 en Situación de Últimos Días

- ✓ Cabecero de la cama a 45°. Habitación ventilada, ambiente tranquilo y confortable donde el paciente se encuentre lo más cómodo posible.
- ✓ Ajustar los tratamientos en función de las patologías de base (EPOC, IC, etc.) que puedan incrementar la sensación disneica.

Autores
 María Ajenjo González
 Lisardo García Matarín
 José Tomás Gómez Sáenz
 Leovigildo Ginel Mendoza
 Bartolomé Leal Correa
 GdT de Respiratorio.



En bolos:	Infusión continua:
D. inducción: 12,5-25 mg. Repetir cada 5' hasta Ramsay 2-3.	D. inducción: 12,5-25 mg en bolo. Repetir cada 5' hasta Ramsay 2-3.
D. mantenimiento: 12,5-25 mg/6h. Rescate: 12,5-25 mg/4-8 h.	D. infusión: 100 mg/día. Rescate: 12,5-25 mg/4-8 h.
Dosis máxima: 300 mg/día.	Dosis máxima: 300 mg/día.

Escala de Ramsay: nivel de sedación
1 Despierto inquieto, ansioso y/o agitado
2 Despierto, cooperador, orientado y tranquilo
3 Dormido con respuesta a órdenes
4 Dormido con breves respuestas a la luz y al sonido
5 Dormido con respuesta solo al dolor
6 Profundamente dormido, sin respuesta a estímulos

En bolos:	Infusión continua:
D. inducción: 0,5 mg.	D. inducción: 0,5 mg en bolo.
D. mantenimiento: 0,5-2 mg cada 6-8 h.	D. infusión: 2-8 mg/día.
Dosis máxima: 8 mg/día.	Dosis máxima: 8 mg/día.

* Si tomaba morfina, aumentar entre 30- 50% la dosis de base.

‡ Instruir a la familia en cómo realizar los bolos de medicación y ofrecer apoyo.

‡ Precisa consentimiento informado implícito, explícito o delegado.